

# BOLLETTINO

DEI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

---

---

Numero 641 — Volume XXVI

---

---

DOTT. LUIGI COGNETTI DE MARTIIS

## Nuove specie dei generi **PHERETIMA** e **DICHOGASTER**

(*Diagnosi preliminari*).

Pubblico in questa nota i primi risultati dello studio di alcune collezioni di Oligocheti affidatemi dal Museo di Amsterdam e provenienti dalla Nuova Guinea Olandese. Raccoglitori furono i Dottori L. F. DE BEAUFORT e H. A. LORENTZ.

### **Pheretima cyclops** n. sp.

Brunastro. Numeri delle setole: 56 al 9°, 34 al 19°, 34 al 30°. Primo poro dorsale  $\frac{12}{13}$ . Clitello? Pori maschili al 18° in direzione delle setole *b*; l'intervallo fra i due pori, corrisponde a  $\frac{1}{7}$  del perimetro, ed è privo di setole; ogni poro è circondato da una lieve intumescenza. Pori delle spermateche impari mediani ventrali agl'intersegmenti  $\frac{5}{6}$  e  $\frac{6}{7}$ . Disseppimenti  $\frac{5}{6}$ - $\frac{7}{8}$  leggermente ispessiti;  $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  presenti, il primo incompleto. Ciechi intestinali semplici. Un paio di sacchi seminali digitiformi al 12°. Prostate compatte, disposte nei segmenti 17° e 18°, canale muscolare sigmoide, privo di tasca copulatrice. Spermateche impari mediane, ampolla ovoide, canale munito a metà di due brevi diverticoli subcilindrici. — Lunghezza 23 mm., spessore mm., 2,5; numero dei segmenti 125.

M.<sup>ti</sup> Cicloop, aprile 1903.

**Pheretima aberrans** n. sp.

Bruniccio scuro. Zone setigere un po' più chiare. Numeri delle setole: 50 al 6°, 65 al 12°, 50 al 1°. Primo poro dorsale all'interseggio  $\frac{13}{14}$ . Clitello? Pori maschili al 18°, separati da un intervallo pari a circa  $\frac{1}{5}$  del perimetro e provvisto di 16 setole. Ogni poro è circondato da una lieve intumescenza. Pori delle spermateche due paia agl'intersegmenti  $\frac{6}{7}$  e  $\frac{7}{8}$ . Dissepimenti  $\frac{5}{6}$  a  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{10}{11}$  -  $\frac{11}{12}$  leggermente ispessiti;  $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  assenti. Ciechi intestinali semplici. Capsule seminali pari al 10° e 11°; sacchi seminali all'11° e 12°. Prostate disposte nei segmenti 17° e 18°, canale muscolare leggermente curvo, provvisto di tasca copulatrice in cui s'aprono alcune ghiandole tubolose in parte comprese nello spessore della tasca medesima. Spermateche con ampolla ovoidale e canale corto, munito presso il poro esterno di un diverticolo digitiforme più corto dell'ampolla. — Lungh. 55 mm., spessore mm. 2,5-3; numero dei segmenti 96.

Contrada di Manikion, febbraio 1903.

**Pheretima flabellifera** n. sp.

Bruniccio cenerognolo. Num. delle setole: 60 al 10°, 50 al 24°. Primo poro dorsale? Clitello 14-16, provvisto di setole. Pori maschili al 18°, separati da un intervallo pari a circa  $\frac{1}{3}$  del perimetro, e provvisto di 15 setole. Papille pari al 18° e 19°, papille impari mediane ventrali al 7°, 8°, 19° 20°. Pori delle spermateche tre paia agl'intersegmenti  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{6}{7}$ ,  $\frac{7}{8}$ . Dissepimenti tutti sottili, l' $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  sono presenti. Ciechi intestinali? Capsule seminali pari al 10° e 11°, munite di grossi lobi laterali che hanno in parte significato di sacchi seminali. Prostate provviste di porzione ghiandolare formata di prolungamenti digitiformi disposti a ventaglio esteso dal 17° al 23°; canale muscolare fusiforme, sigmoide, privo di tasca copulatrice. Spermateche con ampolla sub-piriforme, canale cilindrico provvisto di un diverticolo claviforme poco più corto dell'ampolla e canale presi assieme. — Lungh. 26 mm.; spessore mm. 2,5-3; numero dei segmenti, 73.

Contrada di Manikion, febbraio 1903.

**Pheretima tavvarinensis** n. sp.

Bruno scuro. Numeri delle setole: 42 al 16°, 37 al 26°. Primo poro dorsale all'interseggio  $\frac{11}{12}$ . Clitello 14-17, provvisto di setole. Pori

maschili al 18°, separati da un intervallo pari a  $\frac{1}{6}$  del perimetro, e provvisto di 6 setole. Pori delle spermateche un paio all'intersegmento  $\frac{7}{8}$ . Dissepimenti  $\frac{6}{7}$ ,  $\frac{7}{8}$ ,  $\frac{10}{11}$  e  $\frac{11}{12}$  leggermente ispessiti,  $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  presenti. Ciechi laterali assenti? Capsule e sacchi seminali? Prostate al 18°: porzione ghiandolare ovoidale, canale quasi cilindrico, dritto, privo di tasca copulatrice. Spermateche claviformi, breve diverticolo sferico pedunculato. — Lungh. 15 mm.; spessore mm. 1-1,5 mm; numero dei segmenti 73.

Presso il fiume Tawarin, a occidente dei monti Cycloop, giugno 1903.

### **Pheretima Beaufortii** n. sp.

Gialliccio-cenerognolo. Numeri delle setole: 40 al 6°, 48 al 10°, 52 al 17°, 44 al 26°. Clitello 14-16, privo di setole. Pori maschili al 18°, separati da un intervallo pari a  $\frac{1}{4}$  del perimetro, e provvisto di 10 setole. Pori delle spermateche due paia agl'intersegmenti  $\frac{6}{7}$  e  $\frac{7}{8}$ . Dissepimenti  $\frac{5}{6}$  a  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{10}{11}$  a  $\frac{13}{14}$  ispessiti,  $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  mancano. Ciechi intestinali intagliati al margine inferiore. Capsule seminali pari al 10° e 11°; sacchi seminali all'11° e 12°, bilobi all'estremità. Prostate contenute nei segmenti 17° e 18°, canale muscolare arcuato, provvisto di tasca copulatrice robusta in cui s'aprono due grosse ghiandole cilindriche. Spermateche con ampolla ovoidale e canale di ugual lunghezza, provvisto di un diverticolo subcilindrico, ondulato lungo quanto  $\frac{3}{4}$  dell'ampolla e del canale presi assieme. — Lunghezza 180 mm.; spessore 4-6 mm.; numero dei segmenti 103.

Aba, nella baia Galvink, agosto 1903.

*homoeotrocha*

### **Pheretima ~~ontrekensis~~** n. sp.

Bruno-violaceo, corone setigere grigio cenere. Numeri delle setole 60 al 6°, 60 al 10°, 60 al 17°, 60 al 26°. Primo poro dorsale  $\frac{12}{13}$ . Clitello 14-16, privo di setole. Pori maschili al 18°, in una depressione mediana ventrale estesa da  $\frac{1}{2}$  17 a  $\frac{1}{2}$  19; tra i due pori un intervallo pari a  $\frac{1}{6}$  del perimetro, e provvisto di 4 setole. Papille ventosiformi: 1 paio al 9°, 1 paio al 10°, 2 paia al 17°, 1 paio al 18°, 2 paia al 19°, un paio al 20°. Pori delle spermateche 2 paia agl'intersegmenti  $\frac{7}{8}$ ,  $\frac{8}{9}$ . Dissepimenti  $\frac{5}{6}$  a  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{10}{11}$  a  $\frac{13}{14}$  robusti,  $\frac{8}{9}$  e  $\frac{9}{10}$  assenti. Ciechi intestinali con margine inferiore lobato. Capsule seminali pari al 10° e 11°; sacchi seminali all'11° e 12°. Prostate estese nei segmenti 17-19; canale muscolare curvo, molto ingrossato all'estremità

distale. Spermateche con ampolla sacciforme, e canale muscolare poco più lungo; diverticolo moniliforme più lungo dell'ampolla e del canale presi assieme. Lunghezza mm. 90; spessore mm. 4; numero dei segmenti 110.

Omtrek, della baia Humboldt, maggio 1903.

Dinton

### **Pheretima wendessiana** n. sp.

Bruno scuro dorsalmente, con zone setigere giallastre; grigio-giallognolo ventralmente. Numeri delle setole: 70 al 6°, 82 al 10°, 104 al 17°, 92 al 20°, 102 al 26°. Clitello 14-16, sprovvisto di setole. Primo poro dorsale  $^{12}/_{13}$ . Pori maschili al 18°, separati da un intervallo poco minore di  $^{1}/_{3}$  del perimetro, e provvisto di 18 setole. Pori delle spermateche due paia agl'intersegmenti  $^{6}/_{7}$  e  $^{7}/_{8}$ . Dissepimenti  $^{5}/_{6}$  a  $^{7}/_{8}$  e  $^{10}/_{11}$  a  $^{13}/_{14}$  ispessiti,  $^{8}/_{9}$  rudimentale,  $^{9}/_{10}$  assente. Ciechi intestinali moniliformi. Capsule seminali pari al 10° e 11°; sacchi seminali all'11° e 12°. Prostate estese nei segmenti 16-19; canale muscolare cilindrico spiraleto, provvisto di una piccola borsa copulatrice: in cui sbocca una grossa ghiandola tubulosa situata nel 19°. Spermateche con ampolla globosa e canale un po' più corto munito di un diverticolo quasi lungo quanto il canale. — Lungh. 145 mm.; spessore 5-8 mm.; numero dei segmenti 61.

Wendessi, a occidente della baia Gelwink. luglio 1903.

### **Pheretima myri~~l~~chasta** n. sp.

Grigio scuro. Numeri delle setole: 184 al 2°, 291 al 6°, 122 al 17°. Primo poro dorsale  $^{8}/_{9}$ . Clitello 14-16, provvisto di setole. Pori maschili al 18°, separati da un intervallo pari a  $^{1}/_{5}$  del perimetro, e provvisto di 20 setole. Papille appaiate al 10°, 17°, 20°-22°; macchie scure appaiate al 23°-30°. Pori delle spermateche cinque paia ai segmenti  $^{4}/_{5}$ ,  $^{5}/_{6}$ ,  $^{6}/_{7}$ ,  $^{7}/_{8}$ ,  $^{8}/_{9}$ . Dissepimenti  $^{5}/_{6}$  a  $^{7}/_{8}$  molto ispessiti,  $^{8}/_{9}$  a  $^{12}/_{13}$  rudimentali e sottili. Ciechi intestinali assenti. Capsule seminali riferibili al 10° a 11°; sacchi seminali riferibili all'11° e 12°. Prostate al 18°, canale quasi rettilineo, privo di tasca copulatrice. Spermateche con ampolla subgloboide e canale di lunghezza minore provvisto di un diverticolo claviforme lungo più del canale medesimo. — Lungh. 105 mm.; spessore 5-7 mm.; numero dei segmenti 211.

Presso il fiume Tawarin, a occidente dei monti Cycloop, giugno 1903.

**Pheretima jocchana** n. sp.

Grigio giallastro. Numero delle setole: 168 al 26°. Primo poro dorsale  $^{12}/_{13}$ . Clitello 14-16, provvisto di setole. Pori maschili al 18°, in due profonde infossature confluenti ventralmente; l'intervallo fra i due pori corrisponde a circa  $^{1}/_3$  del perimetro, e contiene una ventina di setole. Tubercoli appaiati al 17° e 19°. Pori delle spermateche un paio all'intersegimento  $^{7}/_8$ . Dissepimenti  $^{4}/_5$  -  $^{9}/_{10}$  più o meno ispessiti. Ciechi intestinali assenti. Capsule seminali pari al 10° e 11°; sacchi seminali all'11° e 12°. Prostate contenute nel 18°, canale muscolare robusto, corto, espanso in una tasca copulatrice. Spermateche allungate, ampolla e canale di lunghezza pressochè uguale; diverticolo 3-4 loculare intraparietale. — Lungh. 220 mm., spessore 7-9 mm.; numero dei segmenti 320.

Joccha, sulle rive del lago Sentani, presso la baia Humboldt, giugno 1903

**Pheretima sentanensis** n. sp.

Grigio-giallastro. Numeri delle setole: 192 al 6°, 93 al 10°, 65 al 17°, 55 al 26°. Primo poro dorsale  $^{13}/_{14}$ . Clitello 14-16, provvisto di setole. Pori maschili al 18°, separati da un intervallo pari a circa  $^{1}/_4$  del perimetro e contenente 12 setole. Papille appaiate all'8° e 9° e al 17° 18°, 22° (23°, 24°, 25°), macchie scure trasversali al 24°-27° (28°-29°). Pori delle spermateche cinque paia agl'intersegmenti  $^{4}/_5$ ,  $^{5}/_6$ ,  $^{6}/_7$ ,  $^{7}/_8$ ,  $^{8}/_9$ . Dissepimenti  $^{4}/_5$  -  $^{7}/_8$  più o meno ispessiti,  $^{8}/_9$  sottile,  $^{9}/_{10}$  a  $^{11}/_{12}$  incompleti, rudimentali. Ciechi intestinali assenti. Capsule seminali impari sottoesofagee al 10° e 11°, la capsula del 10° munita di lobi laterali; sacchi seminali all'11° e 12°. Prostate al 18°, canale piegato ad ansa o a spira, privo di tasca copulatrice. Spermateche con ampolla ovoide e canale corto, provvisto di diverticolo di ugual lunghezza. — Lunghezza 45-52 mm., spessore circa 4 mm.; numero dei segmenti circa 130.

Joccha, sulle rive del lago Sentani, presso la baia Humboldt. Giugno 1903.

**Pheretima monopera** n. sp.

Cenerognolo-gialliccio. Numeri delle setole: 58 al 6°, 45 al 10°, 37 al 17°, 30 al 26°. Primo poro dorsale  $^{12}/_{13}$ . Clitello? Pori maschili al 18° su un paio di tubercoli trasversalmente ovali, circondati ognuno da

un'area un po' depressa, di tinta oscura estesa in lunghezza sui segmenti 18° e 19°; le due aree sono avvolte da una lieve intumescenza ghiandolare biancastra. L'intervallo fra i due pori maschili corrisponde a  $\frac{1}{8}$  del perimetro, ed è privo di setole. Un paio di macchie giallastre al 17°. Papille piccole appaiate al 6° e 7°. Poro della spermateca impari mediano ventrale all'intersegno  $\frac{5}{6}$ . Dissepimenti  $\frac{5}{6}$ - $\frac{7}{8}$  robusti,  $\frac{8}{9}$  assente. Ciechi intestinali? Capsule seminali pari all'11°, sacchi seminali al 12°. Prostate al 18°, canale muscolare piegato ad ansa, privo di tasca copulatrice. Spermateche impari con ampolla subpiriforme e canale di ugual lunghezza munito di 2 diverticoli brevi. Lunghezza 47 mm.; spessore 3 mm.; numero dei segmenti 117.

Joccha, sulle rive del lago Sentani, presso la baia Humboldt, giugno 1903.

### **Pheretima colossus** n. sp.

Viola scuro sul dorso, con striscie setigere grigie, grigio chiaro ventralmente. Numeri delle setole: 100 al 6°, 125 al 10°, 200 al 17°, 190 al 26°. Primo poro dorsale  $\frac{13}{14}$ . Clitello 14-16, provvisto di setole. Pori maschili su due larghi tubercoli scuri, distanti 2 mm., fra essi si contano 8 setole. Pori delle spermateche cinque paia agl'intersegmenti  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{6}{7}$ ,  $\frac{7}{8}$ ,  $\frac{8}{9}$ ,  $\frac{9}{10}$ , ravvicinati alla linea ventrale mediana. Dissepimenti  $\frac{5}{6}$ - $\frac{10}{11}$  più o meno ispessiti. Ciechi intestinali semplici. Un paio di capsule seminali all'11°; un paio di sacchi seminali al 12°. Prostate al 18°, con canale piegato ad ansa o a spira. Spermateche con ampolla piriforme allungata e canale di due terzi più corto, provvisto di un diverticolo uni-obiloculare compreso nello spessore della parete ma facente ernia alla superficie. — Lungh. 230 mm.; spessore 18 mm.; numero dei segmenti 80 (esemplare incompleto).

Monti Resi, agosto 1907.

### **Dichogaster tamiana** n. sp.

Bruno. Setole geminate, tutte ventrali. Primo poro dorsale  $\frac{44}{12}$ . Clitello 13-20 poco sviluppato nella regione mediana ventrale. Due paia di prostate ai segmenti 17° e 19° che sono un po' depressi nella regione mediana ventrale al pari del 18°. Pori delle spermateche due paia agl'intersegmenti  $\frac{7}{8}$  e  $\frac{8}{9}$ . Dissepimenti  $\frac{10}{11}$  e  $\frac{14}{12}$  debolmente ispessiti. Ventrigli al 6° e 7°; tre paia di ghiandole calcifere al 15°, 16°, 17°, il terzo paio di mole minore. Micronefridi in 4 serie longitudinali per lato. Testes liberi al 10° e 11°; sacchi seminali assenti.

Prostate tubolose un po' raggomitolate su se stesse. Setole peniali leggermente arcuate, di due tipi: *a*) lunga mm. 0,41 a 0,42 e spessa mm. 0,015, provvista di una dozzina di lievi depressioni a margine posteriore arcuato e munito di una serie di piccoli denti; *b*) lunga mm. 0,33 a 0,34, spessa mm. 0,010, liscia, dotata di due o tre deboli ingrossamenti presso l'apice. Spermateche con ampolla ovale e canale di ugual lunghezza, provvisto nel tratto prossimale di un diverticolo uniloculare nelle spermateche del primo paio, biloculare in quelle del secondo. — Lungh. 25-30 mm., spessore 2 mm.; numero dei segmenti 120-135.

Dintorni del fiume Tami a occidente della baia Humboldt, e <sup>Omtrek,</sup> ~~Omtrek~~ <sup>dintorni</sup> di questa stessa baia. Marzo-Giugno 1903.